

生育期短、  
全年可栽培的油菜新品種

# 秀春

· 黃文堃 ·



「秀春」株型直立，葉柄肥厚。

油菜屬於十字花科芸苔屬植物，又名油麻菜，一年生或越年生直立性草本作物，按農業分類，油菜可分大油菜及小油菜，在台灣，蔬菜用油菜大都屬於小油菜之類型。目前台灣種植較多的縣份有彰化、台中、苗栗、嘉義、雲林及南投縣等。

油菜的莖葉含有豐富的維他命A、B1、B2、C及蛋白質，也含鈣、鐵等礦物質，常吃能預防高血壓、加強眼力，並具有利尿、



不同品種比較



解熱、美化肌膚、預防皮膚病的效果，不論任何年齡的人都應該多吃。油菜具有清淡的風味、爽脆的口感，適於炒食、清燙、煮湯等烹調。

葉菜類蔬菜是人們每天不可缺少的副食品，它是維持人體健康所必需的維生素、礦物質的主要來源，人民生活水準不斷提高，對蔬菜的選擇標準也不斷提升，因此，農友種苗公司為增加葉菜類的需求，特別育成油菜新品種「秀春」，讓消費者能吃到品質更佳的蔬菜。

## 一、品種特性

油菜「秀春」生長快速，全年可栽培；株形直立，葉柄肥厚、青綠色，葉片厚橢圓型，葉色綠。「秀春」具有生育期短、耐熱性



油菜「秀春」田間生長強健

強、抽苔晚、葉質柔嫩、富甘味、適應性廣、貯運性強、產量高等等之優良特性，而且適合台灣風土栽培，全年四季平地皆可種植。

## 二、栽培管理

油菜「秀春」生育適溫15~32°C，若氣溫低於5°C以下就容易抽苔開花。油菜性喜溫暖濕潤氣候，對土壤的選擇不嚴，以排水良好、土壤pH值在6.0~7.5、土層深厚而肥沃的砂壤土或壤土或粘質壤土皆適於種植。在夏季多雨季節利用網室栽培，可減少雨水沖刷、強光直接照射。作高畦或平畦栽培，畦寬180公分，以直播、撒播方式，本葉二片時，間拔不良幼株，成株距8~10公分為宜，植株過密容易徒長，植株發生軟弱現象。

家庭園中栽培時用直播，如果是使用容器栽培，可將容器內裝填培養土(將農友有機培養土、滿地王介質及滿地王通用有機肥各一份混合作成培養土)，直接將種子撒播在培養土上，再用培養土覆蓋種子後澆水，之後每天再以澆水壺小心澆水，播種後2~3天發芽，8~10天長出2片本葉時需間拔，將比較衰弱、罹病株、發芽慢的植株拔除，疏苗株距為10公分左右，密度太高通風不良會造成病蟲害的發生，夏季高溫適度的遮光可提高品質，可用24目的綠網遮光；陽台頂樓全日照或半日照皆可栽培。

## 三、肥水管理

生育初期需有適當的水分以利生長，油菜主根不發達，根群分布在表土層，根之再生能力較強；生育期注意灌水，尤其在較鬆土壤栽培時更應注意。於生育初期酌施氮肥及磷肥，以促進生長；油菜生育快速，產量

之構成，即葉數和葉重之增加，與肥料有密切關係，肥料以氮肥最重要，宜著重基肥，尤其有機質肥料肥效顯著；追肥宜分多次施用，在真葉發生期間開始施用，並以速效性肥為佳，追肥在生育初期施較稀薄為宜，在生育盛期可以加重。家庭栽培可以使用葉綠精稀釋1000倍作葉面噴施，約7天施用一次。

## 四、病蟲害防治

生長過程中常見有幼苗立枯病、露菌病、小菜蛾、斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、蚜蟲及黃條葉蚤等病蟲害，防治方法可參考《植物保護手冊》推薦之藥劑。

## 五、採收

油菜「秀春」播種後25天左右，可陸續採收，每500公克綁成一束或袋裝，可保持新鮮美感。油菜為淺根性蔬菜，不耐乾旱，又怕太潮濕易造成病害，下雨後要盡速排水，只讓土壤保持濕潤，避免浸水情形；採收前2~3天適當的灌水，可增加產量及脆度、口感。網室及露地栽培，夏天播種後25天左右可採收，秋冬季播種後28天可採收。🌱



採收包裝上市