

優質香甜的紅色 小番茄

甜愛

· 黃俊傑 ·



番茄屬於茄科中的番茄屬，學名 *Lycopersicon esculentum* Mill，1~2 年生的草本植物，是具有高經濟價值的農作物，也是台灣重要的果菜類蔬菜之一。番茄營養豐富，除了有益人體健康的營養成分外，果實還有多種形狀、顏色及不同大小，高甜度及風味佳。特別是小果品種食用方便，已成為國人日常生活中重要的水果之一。

近年來農業環境日益惡劣，栽培十分不易，有鑑於此，農友種苗公司積極培育出易栽培、風味佳、豐產的番茄新品種「甜愛」，以供應番茄生產與市場消費需求。茲介紹其品種特性如下，以供參考。

一、品種介紹

「甜愛」耐番茄捲葉病毒病(TYLCV)、抗番茄嵌紋病毒病(ToMV 0、1、2)及萎凋病小種 1、2。植株高性，果實橢圓，果色紅亮，果重約22公克。糖度8.5度，質優口感佳。果實硬，裂果少，貯運性佳。播種至採收約82天。

二、栽培要點

(一)播種適期：

台灣地區中部以南，8月至翌年2月可播種栽培，以104格穴盤育苗，簡易方便且成活率高。苗株健壯，幼苗生長 4~6 片本葉時，即可定植於田間。若遇梅雨或颱風季節，應減少澆水，以防止苗株過度徒長。

(二)栽培土壤與環境：

栽培田宜選擇地勢高、排水良好之砂質土或砂質壤土，且日照充足、通風良好之環境為最理想，土壤酸鹼度約 pH6~7。多施有機質



「甜愛」果實橢圓紅亮，質優口感佳。



「甜愛」植株生育健壯，結果豐多。



「甜愛」果實大小均勻整齊

肥料，氮肥不可過量。

(三)栽培行株距：

需立支柱栽培管理，行距150公分(含畦溝)栽二行、株距45公分。

(四)整枝：

宜行雙幹整枝，自主莖第一個花序直下的側枝作為第2主幹，其他下部側枝均全部摘除。在生長期中，雙幹之葉腋長出的側芽應儘早摘除，以利植株生長發育，且果實大小發育均勻整齊。

(五)灌水：

經常檢查畦面的土壤含水量，再決定灌溉時間、次數。為配合田間整體栽培管理作業，保持土壤水分平衡，視土壤乾濕度適宜灌水。第一花序果實轉紅時，必須節制灌水和施肥，以提高甜度。不要使田間水分變化過於劇烈，以減少裂果發生。

(六)採收適期：

待果實完熟後再採收，甜度較高、風味品質較佳；多雨時可提早採收，減少裂果發生。

(七)病蟲害防治：

育苗期與生長期特別注意銀葉粉蝨、潛葉蠅等為害。雨前及雨後應噴藥防治病蟲害發生，特別加強細菌性斑點病與早疫病的防治。防治方法請參照《植物保護手冊》所推薦的藥劑、濃度及時期施用之。

(八)植物生長素處理：

若需以荷爾蒙(植物生長調節劑「番茄多旺」100倍或「番茄美素」1000倍)來促進花朵之結果，宜每隔7天施用一次，且需注意每一花序以噴灑一次為原則，否則易造成果實畸形及空心，施藥時間建議以下午3點後為宜。並須特別注意噴頭加蓋，以防傷及芽頂，造成萎縮及葉變狹小。 ①