



優質甜美的 橙色小番茄 新品種

麗金

· 黃俊傑 ·

一、品種特性

「麗金」植株高性，中耐番茄捲葉病毒病(TYLCV)、抗番茄嵌紋病毒病(ToMV-0、1、2)及萎凋病(Race1、2)。果實長橢圓形，橙色亮麗，果重約22公克。肉厚口感佳，風味香甜，糖度可達9.4度；果實硬，耐裂果，貯運佳。播種至採收，秋作約90天。

二、栽培要點

(一)播種育苗：

台灣地區中部以南，8月至翌年2月為播種適期。以104格穴盤播種，簡易方便且成活率高，苗株健壯。幼苗以生長至4~6片本葉之植株為佳，即可定植於田間。若遇梅雨或颱風季，應減少澆水，以防止苗株過度徒長。

(二)土壤與環境：

栽培田宜選擇地勢高、排水良好之砂質土或砂質壤土，且日照充足、通風良好之環境為最理想，土壤酸鹼度為pH6~7。多施有機質肥料，氮肥不可過量。

(三)行株距：

立支柱栽培，行距150公分(含畦溝)栽二行、株距45公分。

(四)整枝：

宜行雙幹整枝，自主莖第一個花序直下的側枝作為第2主幹，其他下部側枝均全部摘除。在生長期中，雙幹之葉腋長出的側芽應儘早摘除，以利植株生長發育，且使果實大小發育均勻整齊。

(五)灌水：

經常檢查畦面的土壤含水量，再決定灌溉時間及次數。為配合田間整體栽培管理作業，應保持土壤水分平衡，視土壤乾濕度適宜灌水。第一花序果實轉紅時必須節制灌水和施肥，以提高果實甜度。儘量勿使田間水分變化過於劇烈，以減少裂果發生。

(六)採收適期：


待果實完熟後再採收，甜度高、風味品質較佳；多雨時可提早採收，減少裂果發生。

(七)病蟲害防治：

育苗期與生長期特別注意銀葉粉蝨、潛葉蠅為害。雨前及雨後應噴藥防治病蟲害發生，特別加強細菌性斑點病與早疫病的防治。防治方法請參照《植物保護手冊》所推薦的藥劑、濃度及時期施用之。

(八)植物生長素處理：

若需以荷爾蒙(植物生長調節劑「番茄多旺」100倍或「番茄美素」1000倍)來促進花朵之結果，則每隔7天施用一次(注意每一花



果實橙色亮麗、大小均勻。

序以噴灑一次為原則，否則易造成果實畸形及空心)，施藥時間建議以下午3點後為宜，並須特別注意噴頭加蓋，以防傷及芽頂，造成萎縮及葉變狹小。



植株生育強健，結果豐多。