



「鐵娘」植株留果情形



「鐵娘」植株生育健壯

茄紅番茄「鐵娘」 · 黃俊傑 ·

一、品種特性

「茄紅」番茄(俗稱牛番茄)。植株高性，果實稍扁球至球型，果肩淡綠色，成熟果紅色，採收完熟果實。果重約200公克，果實硬，裂果少，耐貯運。播種至採收約112天。

二、栽培要點

(一)播種適期：

台灣地區平地8~9月、12月下旬至翌年1月上旬，中部高冷地2~5月。

(二)育苗：

以104格穴盤育苗或向育苗場訂購苗株。穴盤育苗簡易方便，成活率高且苗株健壯。幼苗生長4~6片本葉時，即可定植於田

間，若遇颱風季無法適時定植時，應減少澆水，以防止苗株過度徒長。

(三)土壤與環境：

栽培田宜選擇地勢高、排水良好之砂質土或砂質壤土，日照充足、通風良好之環境為最理想，土壤酸鹼度pH值約在6~7之間。切忌連作，以減少土壤病害之發生。多施有機質肥料，但氮肥不可過量。

(四)行株距：

立支柱栽培，行距150公分(含畦溝)栽二行，株距45公分。

(五)肥料：

基肥勿施用過多氮肥或雞糞，以免造成枝葉過度茂盛，影響花芽分化及開花結果。土壤pH值在6以下時，每分地以苦土石灰40



「鐵娘」結實纍纍產量高(鄭宇庭提供)



植株下部葉片摘除，以利通風光照(鄭宇庭提供)



「鐵娘」每一果房留4-5果，果實大小均勻整齊

公斤撒施，翻犁入土後再施基肥，以改良土壤酸性，並提高品質。追肥定植後，每隔2~3星期以台肥43號複合肥料施肥一次，每分地用量約30~40公斤。

(六)整枝：

採行單幹整枝栽培，在生長期中長出的側芽，應待芽長10公分左右才摘除，不宜過早，以免影響根系的生長。每一果房留4~5果，不良果或畸形果儘早摘除，7段花後留3片葉摘心，以利植株生長發育，且果實大小生育均勻整齊。

(七)灌水：

配合田間整體栽培管理作業，保持土壤水分平衡，視土壤乾濕度適宜灌水。氣候炎熱又未下雨時，約每隔10~14天灌水一次；

特別是始花期到盛果期，應適量控制給水，不可過乾或過濕，而引發果實頂腐病。果實成熟轉紅時必須節制灌水和施肥，以提高甜度，而且不要使田間水分變化過分劇烈，以減少裂果發生，若遇颱風季節注意排水。

(八)採收適期：

待果實成熟轉色完成後採收，甜度較高、風味品質較佳。

(九)病蟲害防治：

育苗期與生育期特別注意銀葉粉蝨、潛葉蠅的為害。雨前及雨後應噴藥防治病蟲害發生，高溫多雨時特別加強細菌性斑點病與早疫病的防治。防治方法請參照《植物保護手冊》所推薦的藥劑、濃度及時期施用之。🕒