



黃皮橙色肉的洋香瓜新品種

· 潘恩賜 ·

月香

台灣現行栽培的黃皮洋香瓜品種，其中「狀元」及「金蜜」由於低溫肥大性良好、品質佳、糖度高、外形美觀等特點，為早春的主要黃皮品種。農友種苗公司為符合生產者的栽培需求，近年來在黃皮類洋香瓜選育上，更加積極著重早生、栽培容易、外觀美、耐病等特性的研發改良。經多年努力及多點區域試作結果，於2010年育成黃皮洋香瓜新品種「月香」，相信該品種必定能受到消費者、青果商及生產者的青睞，並帶給瓜農更高的栽培收益，也帶給消費大眾不一樣的口感及味覺享受。

一、品種特性

(一) 植株特性：

「月香」植株長勢強健，生育期莖蔓伸長快速，開花結果期雌花安定，結果力強。

果實肥大期植株生育旺盛，耐早衰性強，栽培容易。可有效節省栽培管理成本，為適合台灣秋作及春作栽培之黃皮橙肉品種。

(二) 果實特性：

「月香」屬早生品種，幼果淡綠色，成熟果實金黃色。果實短橢圓形，果重約1.5



採用穴盤育苗，苗株整齊度高，方便栽培管理。

公斤，果面光滑，果皮金黃亮麗。果實含糖量14~16%，果肉淡橙色，肉質細脆，風味極優。

(三)全生育期：

播種至採收65~80天，開花至採收30~35天。成熟期比「金蜜」品種早5~7天。

二、栽培要點

(一)播種適期：

台灣南部播種適期，春作1~3月、秋作9~10月為宜。早春或晚秋播種時，栽培期間會遇到低溫，果實肥大不良且偏小，商品價值較低。

(二)種子消毒：

為預防種子附帶病原菌，影響種子發芽率及成苗率，危害幼苗和傳播病害，種子播種前宜先浸種消毒，將種子放入已打洞的塑膠袋內，利用嘉賜銅(81.3%可濕性粉劑)1000倍溶液，浸種消毒6小時。

(三)催芽育苗：

種子消毒後，不經水洗直接用濕毛巾包裹，放入不密封的塑膠袋中，保持毛巾濕潤及透氣，然後置於30~32℃的恆溫下催芽24~28小時，待芽尖露出種殼，芽長約0.3公分，即可播種於裝填「滿地王」介質之104孔穴盤育苗。待苗株本葉1~2葉、春作

苗齡15~20天、秋作苗齡10~12天時，即可定植於本田。

(四)行株距：


隧道棚雙蔓匍地式栽培，畦中央雙向栽植，行距2.5~2.7公尺(含畦溝)，株距40公分，每分地可種植900~1000株。溫網室設施搭設菊花網，採直立式栽培，單行植距1.2公尺，株距35公分，每分地約種植2300株。

(五)適量施肥：

每分地(約10公畝)施用「滿地王」特效有機質肥料600公斤左右、「台肥43號」複合肥料100公斤及過磷酸鈣40公斤，作基肥全面撒施，作畦培土一次完成，生育期間不必再施肥。保肥力較差的土壤，視植株生育情形，必要時再以液體肥料補充之，如「葉綠精」500倍等。



「月香」匍地栽培整枝留果示意圖



「月香」立式栽培整枝留果示意圖



「月香」品種雌花安定，結果力強。



「月香」屬早生品種，果皮轉色快。

(六)整枝與留果：

隧道棚匍地式栽培，依慣行法採雙蔓整枝方式，幼苗本葉3~4葉時摘心，促進子蔓伸長。待子蔓長15公分左右時，選留發育強健整齊的子蔓2條，其餘摘除。子蔓第20~25葉左右摘心，在子蔓第6~9節發生的孫蔓起使其結果。預留結果蔓以下之側蔓盡早摘除，結果蔓在開花期留二葉摘心，結果蔓以上的子蔓放任。幼果如雞蛋大時，每蔓留一果，每株留二果為原則。

溫網室直立式栽培時，採單蔓整枝方式，母蔓直至本葉25~28葉之間摘心，母蔓第9~12節發生之子蔓做為結果蔓。預定結果蔓以內之側蔓盡早摘除，預定結果蔓於雌花開花前留兩葉摘心。下位非結果蔓至少

保留4~5條蔓，留兩葉摘心，植株尾部的子蔓全部摘除。幼果如雞蛋大時，每株留一果。

(七)病蟲害防治：

栽培期間主要病蟲害為毒素病、白粉病、露菌病、銀葉粉蝨、斑潛蠅及青蟲等。病蟲害防治藥劑及施用方法，請參閱《植物保護手冊》，依實際情形選擇1~2種藥劑輪流使用，每隔7天左右噴藥1次防治。

(八)注意事項：

「月香」屬早生品種，栽培期溫度過低時，果實肥大不良，果實較小。若栽培期溫度過高時，則果面稍有溝肋發生。因此，必須把握最適合播種期播種，以免影響果實外觀及產量。🌱



成熟果實皮色金黃，外觀亮麗，超吸睛。



「月香」果實分級包裝